

Tableau du tour de taille en fonction des ethnies d'après l'*International Diabetes Federation*, 2006 (78)

Pays/Ethnie	Tour de taille	
Caucasiens * Aux États-Unis, les valeurs de l'ATP III (102 cm pour les hommes, 88 cm pour les femmes) vont continuer d'être utilisées en clinique	Hommes	≥ 94 cm
	Femmes	≥ 80 cm
Asiatiques du Sud Basé sur une population chinoise, malaisienne et indonésienne	Hommes	≥ 90 cm
	Femmes	≥ 80 cm
Population chinoise	Hommes	≥ 90 cm
	Femmes	≥ 80 cm
Population japonaise **	Hommes	≥ 90 cm
	Femmes	≥ 80 cm
Ethnies d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale	Utiliser les recommandations sud-asiatiques jusqu'à ce que des données plus spécifiques soient disponibles	
Origine ethnique africaine subsaharienne	Utiliser les données européennes jusqu'à ce que des données plus spécifiques soient disponibles	
Populations est-méditerranéennes et populations du Moyen-Orient (arabes)	Utiliser les données européennes jusqu'à ce que des données plus spécifiques soient disponibles	

ATP : *adult treatment panel*

* : dans les futures études épidémiologiques en population caucasienne, il est recommandé de donner les prévalences en utilisant les valeurs seuils européennes et nord-américaines pour permettre une meilleure comparaison.

** : à l'origine, des valeurs différentes ont été proposées pour la population japonaise mais les nouvelles données sont en faveur de l'utilisation des valeurs présentées ci-dessus.